

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Giessen.

Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Geppert.

7926

Die Wirkung der verschiedenen Bestandteile der Terpentinöldämpfe.

DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

medizinischen Fakultät

der

Hessischen Ludwigs-Universität

zu

Giessen

eingereicht von

Joachim Schmidt

geb. in Bomlitz.

Giessen 1926

Verlagsdruckerei Albin Klein in Giessen

vorm. Wilh. Keller, gegr. 1788

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät der Hessischen
Ludwigs-Universität zu Giessen.
Referent: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Geppert.

Es ist seit langem bekannt, daß die Einatmung von Terpentindämpfen giftig wirken kann, falls die Konzentration derselben ausreichend hoch ist. Lehmann¹⁾ gibt an, daß bei Lösungen von 3—4 mgr Terpentinöl auf den Liter Luft bei Katzen rasch Reizung der Schleimhäute und nach einigen Stunden leichte Konvulsionen auftreten. Bei 8 mgr im Liter treten ziemlich bald (1—2 Stunden) Taumeln, Zuckungen und Gleichgewichtsstörungen ein, bei 16 mgr im Liter erfolgen in kurzer Zeit Krämpfe. Bei Menschen kann man bei 4—6 mgr im Liter Augenbeizen, Kopfweh, Schwindel und Uebelkeit beobachten. Konzentrierte Einatmung von Terpentindämpfen kann auch bei Menschen eine tödliche Wirkung auslösen.

Es erhob sich unter diesen Umständen die Frage, ob die verschiedenen Bestandteile des Terpentinöls ungefähr gleich giftig sind, oder ob einzelne als besonders giftig erscheinen; ferner ob die verschiedenen Terpentinöle sich wesentlich verschieden voneinander verhalten. Was zunächst die Bestandteile angeht, so erscheint es relativ einfach, einen derselben, nämlich das Pinen ($C^{10}H^{16}$), in ausreichend reinem Zustand herzustellen. Man destilliert zu dem Zwecke den bei 155—156° C übergehenden Anteil des Terpentinöls für sich ab und destilliert dieses Destillat noch mehrfach weiter. Das im Pharmakologischen Institut dargestellte Präparat hatte bei 19,5° C ein spezifisches Gewicht von 0,862 gr nach Messung im Pycnometer. Es entsprachen 28,730 gr Wasser 24,768 gr Pinen.

Zunächst erschien es erforderlich, festzustellen, welchen Dampfdruck bei 19° C dieses Präparat hat. Dies wurde durch Bestimmung im Vacuum in folgender Weise ausgeführt:

Ein graduiertes Glasrohr von 1,10 m Länge und 18 mm Durchmesser, das oben in einen Hahn ausläuft, auf dem ein kurzes Glasrohr von 6 mm Durchmesser aufgesetzt ist, wird

¹⁾ Lehmann: Handbuch der Hygiene von Rubner, Gruber. Bd. 4 Abtl. 2 S. 268.

mit seiner Mündung in Quecksilber getaucht. Das Quecksilber befindet sich in einem etwa 30 cm hohen und 8 cm breiten Glaszylinder. Die Füllung des sorgfältig gereinigten und getrockneten Glasrohres mit Quecksilber geschieht durch Ansaugen vom Hahn aus bei schief gestelltem Rohr. Ist das Rohr vollkommen mit Quecksilber gefüllt, so wird der Hahn geschlossen und das Rohr senkrecht gestellt. Es bildet sich dann oben ein Vakuum von etwa 15 cm Länge. Man überzeugt sich durch Neigen des Rohres, daß das Quecksilber hart an den Hahn schlägt. Das Rohr ist von einem Wassermantel umgeben. Die Höhe der Quecksilbersäule wird mit dem Barometer verglichen. Das Barometer hatte einen Stand von 755,4 mm, und die Quecksilbersäule eine Länge von 755 mm bei dem folgenden Versuch. Nunmehr wird etwas ausgekochtes Pinen in die Röhre oberhalb des Hahnes gebracht, und durch vorsichtiges Oeffnen des Hahnes ein minimales Quantum Pinen in das Vakuum gesaugt. Ueber den Hahn wird wieder als Abdichtung etwas Quecksilber gefüllt. Dann wird von neuem die Quecksilberhöhe im graduierten Rohr bestimmt und die Temperatur im Wasser festgestellt. Die Quecksilberhöhe ergab sich zu 751,9 mm; daraus ergab sich eine Dampfspannung des Pinen von 3,1 mm bei 19° C. Eine Kontrollbestimmung bei höherer Einstellung des Quecksilbermanikus im Rohr ergab eine auf 0,3 mm übereinstimmende Bestimmung. Eine Wiederholung des Versuches ergab eine Dampfspannung des Pinen von 2,5 mm Quecksilber bei 19° C. Nach der Spannung von 3,0 mm berechnet sich der Gehalt des Raumes an Pinendämpfen zu 0,4 Volumen % und es würden demnach etwa 25 mgr Pinen im Liter Luft bei 19° C gelöst werden können.

Ich gehe nunmehr zu den Versuchen am Tier über. Bei diesen wird das Tier in eine abgegrenzte Atmosphäre gebracht, in der ein genau gemessenes Quantum Terpentinöl etc. verdampft ist.

Eine Maus wird in eine Glasglocke gesetzt, die unten mit geschliffenem Rande auf einer geschliffenen Glasplatte steht. Sie faßt 9,5 Liter; oben läuft sie aus in einen Korkansatz von 3 cm Durchmesser, in den gut schließend ein Kork eingesetzt wird. Der Kork wird durchsetzt von einem Metallrohr von 5 mm äußerem Durchmesser und einer Länge von 20 cm. In diesem Rohr steckt gut schließend ein starker Draht von etwa

35 cm Länge. An seinem unteren Teile (in der Glocke) ist eine Fahne aus Filtrierpapier angebracht. Ist die Maus eingesetzt, so wird der Kork gelüftet und mit einer Capillar-Pipette das betreffende Quantum Pinen, Terpentinöl usw. auf das Filtrierpapier entleert; dann wird der Kork fest geschlossen und durch Rotation des Drahtes, der vermittelt eines Korkes auf dem Rohr aufsitzt, die Flüssigkeit auf dem Filtrierpapier zur Verdunstung gebracht. Auf der geschliffenen Glasplatte liegt ein Bogen Filtrierpapier auf, damit die Maus nicht auf der Glasplatte läuft.

Vorausschicken möchte ich meinen Versuchen, daß durch frühere Versuche im Pharmakologischen Institut festgestellt war, daß Terpentinöl in Dosen von 10 mgr auf den Liter Luft bei Mäusen nach einer halben bis einer Stunde sehr deutliche Erscheinungen hervorbringt, zuerst Aufregung, dann Schwanken, Umfallen und endlich auf der Seiteliegen; dazu gesellen sich krampfhaftige Streckerscheinungen der Extremitäten.

Einen einzelnen solchen Versuch dieser Art habe ich auch gemacht.

Versuch I: 0,11 ccm französischen Terpentinöls unter der Glasglocke von 9,5 l, also auf 1 l Luft 10 mg Terpentin.

10⁴⁵ Uhr Beginn, 10⁴⁹ Terpentin verdampft, 11¹⁰ Maus läuft aufgeregt hin und her, 11²⁵ torkelt deutlich, läuft mit krampfhaften Zuckungen herum, 11²⁸ liegt auf der Seite und fällt um beim Erheben. 11³⁸ Herausnahme der Maus, dreht sich im Kreise, fährt über die Tischkante, fällt auf den Boden, erholt sich schnell nach etwa 5 Minuten.

Versuch II: Mit 0,11 ccm Pinen (spezifisches Gewicht 0,862 bei 19° C) unter einer Glasglocke von 9,5 l, also auf 1 l Luft 10 mgr. Pinen.

10⁴⁰ Uhr Beginn, 10⁴⁸ Pinen verdampft, 11¹⁸ der Schwanz der Maus zeigt beginnende Rötung, Atmung sehr lebhaft, 11²⁵ fängt an zu torkeln, 11³⁶ Maus fällt auf die Seite, richtet sich schwankend wieder auf, 11⁵² Maus fällt beim Aufrichten an der Glaswandung auf die Seite, 12⁰⁸ Maus liegt z. T. auf der Seite, 12⁰⁹ läuft wieder äußerst beschleunigt, 12¹⁸ Maus rast wieder herum und taumelt stark, Augen sind geöffnet, 12²² ebenso, 12²⁵ Maus liegt und zeigt vorübergehend leichte Zitterkrämpfe, 12³³ Maus dreht sich um sich selbst, 12³⁵ rechtes Vorderbein in kurzem Streckkrampf, 12⁴³ rast wieder um-

her, fällt dabei für einen Augenblick auf den Rücken, 4⁵⁵ Maus wird aus der Glasglocke entfernt, 4⁵² erwacht aus dem Schlaf, wird wieder lebhaft, taumelt in ihren Bewegungen, sie fällt beim Laufen zu wiederholten Malen vom hohen Tisch auf den Boden, 5¹⁶ Maus läuft leidlich normal, fällt nicht mehr von selbst über die Tischkante, 5³⁰ wird plötzlich kurzatmig und liegt auf der Seite, 5³³ Reizung durch Hitze am Ofen läßt sie vorübergehend aufleben, sodaß sie wie wild herumläuft, 5³⁵ Maus liegt wie leblos da, die Atmung ist ruckartig, Reizung mit elektrischem Strom bewirkt beschleunigte Atmung, 5⁴⁰ Maus tot, Sektion zeigt keine Besonderheiten.

Zusammenfassung: Nach 40 Minuten beginnt starker Erregungszustand, der sich bald mit Lähmungserscheinungen der Extremitäten verbindet. Die Lähmungserscheinungen werden immer deutlicher. Nach vierständiger Einwirkung lebt die Maus noch. Aus der Glocke genommen, erholt sie sich etwas, stirbt aber 50 Minuten später.

Versuch III: Mit 0,16 ccm Pinen unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10⁴⁰ Uhr Beginn, 10⁴³ Pinen verdampft, 10⁴⁸ Maus unruhig, 10⁵⁶ schwankt beim Laufen, 10⁵⁸ Maus fällt auf den Rücken, 10⁵⁹ rast herum und fällt dabei fortwährend auf die Seite, 11⁰⁸ Maus überschlägt sich mehrere Male über die Seite, Zitterkrämpfe an allen Extremitäten, 11¹⁰ Maus wälzt sich in schweren Krämpfen, 11¹² liegt ruhig mit verbogenem Körper, Atmung äußerst beschleunigt, 11¹³ Herausnahme der Maus, wälzt sich herum in Zitterkrämpfen, linkes Hinterbein zeigt Lähmung, 11¹⁴ sitzt für einen Augenblick still, um aber gleich wieder in Zitterkrämpfe zu verfallen, 11¹⁵ Maus dreht sich im Kreise, wobei linkes Vorder- und Hinterbein gelähmt erscheinen, fällt über die hohe Tischkante, 11²⁰ fällt nicht mehr über die Tischkante, 11³⁰ Maus knabbert an vorgelegter Nahrung, ohne sie aber zu fressen, 11⁴⁰ zeigt große Neigung zum Schlafen, 11⁵⁴ aufgeweckt, macht Maus einen vollkommen normalen Eindruck.

Versuch IV: Mit 0,11 ccm Pinen (10 mgr) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

11¹⁰ Beginn, 11¹⁸ Pinen verdampft, 11¹⁸ Maus unruhig, 11²³ läuft wild umher, 11²⁴ Maus kippt beim Aufrichten auf die Seite, 11²⁷ läuft rasend im Kreise, torkelt, fällt auf die Seite und

rennt dann weiter, 11³⁰ Maus kippt auf den Rücken, 11³¹ Maus überschlägt sich beim Aufrichten, 11³² sitzt mit Kopf und Bauch auf dem Boden, im rechten Vorderbein hat sie einen Zitterkrampf, das rechte Hinterbein steht abduziert und zeigt gespreizte Zehen; 11³³ wieder Zitterkrämpfe an allen Extremitäten, Atmung der Maus äußerst beschleunigt; 11³⁵ liegt auf der Seite und zeigt einen Streckkrampf an allen Beinen, der Schwanz steht steif nach oben gerichtet, 11³⁶ Herausnahme der Maus, sie dreht sich sofort im Kreis, die Hinterbeine sind anscheinend gelähmt, 11³⁸ wird lebhafter, läuft auf dem Tisch herum, fällt aber noch über die Tischkante, Atmung ist sehr beschleunigt, 12¹⁰ zeigt normales Benehmen.

Versuch V: Mit 0,09 ccm Pinen unter einer Glasglocke von 16,5 l, also 5,3 mgr in 1 l.

11¹⁰ Beginn, 11¹⁵ Pinen verdampft, 11³⁵ Maus aufgeregt, läuft hin und her, 11⁵⁰ sie zeigt beim Aufrichten unsichere Bewegungen, 11⁵⁵ Maus sehr unruhig, sie schwankt im Laufen des öfteren auf die Seite, 12¹⁰ Maus rast hin und her und fällt dabei immer wieder auf die Seite, 12²⁰ Maus wird in ihren Bewegungen ruhiger, 12²² läuft wieder wie wild im Gefäß herum, 12²⁵ schwankt auch im Sitzen auf die Seite, 12⁴⁰ Maus sitzt an gleicher Stelle in schiefer Haltung, Kopf und Bauch auf dem Boden, Augen aber geöffnet, 12⁴⁶ Maus läuft wieder unruhig hin und her, 12⁴⁷ Herausnahme der Maus; sie rennt sofort über den ganzen Tisch, fällt über die Tischkante, 12⁴⁹ Maus zeigt vollkommen normales Benehmen, läuft ohne zu schwanken herum, meidet das Herabfallen.

Es wirkten pro l 5,3 mgr auf die Maus ein, d. h. etwa die Hälfte von Versuch II und IV. Daher sind die Vergiftungserscheinungen geringere.

Wie aus den Protokollen ersichtlich ist, unterscheidet sich die Pinenwirkung nicht wesentlich von der des Terpentinöls.

Ich gehe nunmehr über zu denjenigen Versuchen, welche mit den höher destillierenden Produkten des Terpentinöls, aus dem das Pinen dargestellt war, angestellt sind.

Versuch VI: Mit 0,09 ccm IV. Terpentinöldestillat (160 bis 165° C, spez. Gewicht 0,872 bei 19° C) unter einer Glasglocke von 16,5 l.

3⁴⁰ Beginn, 3⁴⁴ Destillat verdampft, 4⁵² Maus hat Neigung

zum Schlafen, 5⁰² Maus erwacht und wird etwas lebhafter, 5⁰³ sitzt wieder, jetzt liegt der Bauch auf dem Boden und der Kopf ist gesenkt, 5¹⁰ Herausnahme der Maus, läuft sofort herum, fällt nicht über die Tischkante, zeigt auch sonst ein vollkommen normales Wesen. Demnach keine wesentliche Wirkung in 1½ Stunden.

Versuch VII: Mit 0,11 ccm IV. Terpentinöl-Destillat unter einer Glasglocke von 9,5 l.

3⁴⁸ Beginn, 3⁵² Destillat verdampft, 3⁵⁵ Maus läuft unruhig hin und her, 4⁰⁹ Maus sehr unruhig, 4¹¹ Maus dreht sich langsam um sich selbst, 4¹⁶ fängt an zu torkeln, die Atmung ist sehr beschleunigt, 4²⁵ Maus liegt auf der Seite und zeigt einen Streckkrampf in allen Gliedern, 4²⁶ Maus dreht sich rasend im Kreise, 4²⁸ läuft schnell im Kreise herum, dann folgt ein Streckkrampf des Rumpfes und der Extremitäten, 4³⁰ sitzt wieder ruhig mit dem Kopf auf dem Boden, Augen halb geschlossen, 4³² Maus fällt mit zitternden Bewegungen auf den Rücken, 4³³ dreht sich im Kreise, dabei sind Zitterkrämpfe der Extremitäten zu beobachten, 4³⁴ Maus fällt wieder in Streck- und Zitterkrämpfe, 4³⁷ in sitzender Stellung, im rechten Hinterbein Zitterkrampf, im linken Hinterbein Streckkrampf, Kopf auf dem Boden, Augen geschlossen, 4⁴⁰ Streckkrampf des Rumpfes und der Extremitäten, Maus liegt in dieser Stellung auf der Seite, die Atmung ist rasend, 4⁴² Maus wälzt sich in Krämpfen, 4⁴³ liegt auf dem Rücken, Streckkrampf des Rumpfes und der Extremitäten, das Maul der Maus ist weit geöffnet, 4⁴⁴ Herausnahme der Maus, 4⁴⁸ Glieder teilweise noch gelähmt, dreht sich im Kreise, fällt beim Laufen über die Tischkante, 4⁴⁹ fällt nicht mehr über den Tischrand, 4⁴⁹ hält sich auf schiefer Glasebene, 4⁵⁰ Maus torkelt ein wenig, 4⁵⁵ Maus schläft in normaler Haltung, läßt sich nur schwer zum Laufen zwingen, 5¹⁰ Maus wird lebhaft, erscheint normal.

Versuch VIII: Mit 0,11 ccm III. Terpentinöl-Destillat (157,5° bis 160° C, spez. Gew. 0,8685 bei 19° C) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10⁴⁵ Beginn, 10⁴⁸ Destillat verdampft, 11⁰⁵ Maus sehr unruhig, torkelt deutlich in der Bewegung, 11⁰⁶ kippt auf die Seite, 11⁰⁸ schwankt auch im Sitzen von einer Seite zur anderen, 11¹² fällt deutlich auf die Seite, 11¹⁶ dreht sich auf der Seite liegend im Kreise, 11¹⁷ rast umher, Kopf und Bauch auf dem

Boden schleifend, schlägt wiederholt auf die Seite, während dabei Rumpf und Glieder einen Streckkrampf zeigen, 11¹⁸ sitzt ruhig, Augen geschlossen, Atmung sehr schnell, 11¹⁹ kippt auf die Seite, in dieser Stellung Streckkrampf, 11²² läuft und fällt auf den Rücken, Rumpf und Extremitäten gestreckt, 11²³ liegt mit gestreckten Gliedern auf der Seite und dreht sich rasend im Kreise, 11²⁴ sitzt ruhig und torkelt dann etwas vorwärts, 11²⁷ Streckkrampf des ganzen Körpers, dabei von einer Seite auf die andere fallend, 11²⁸ sitzt mit verbogenem Körper an der Glaswandung, linkes Vorder- und Hinterbein abduziert, 11³¹ überschlägt sich, liegt auf dem Rücken, 11³² dreht sich mit gestreckten Gliedern auf der Seite liegend im Kreise, 11³⁵ kugelt mehrere Male auf den Rücken, 11³⁶ wälzt sich wie rasend, 11⁴⁰ liegt mit gekrümmtem Körper auf der Seite, 11⁴¹ kippt auf den Rücken und bekommt einen Streckkrampf der Beine, 11⁴² Herausnahme der Maus, liegt auf der Seite, dreht sich im Kreise, weil linkes Hinter- und Vorderbein gelähmt sind, 11⁴⁶ stürzt für kurze Zeit im Zitterkrampf auf den Rücken, 11⁵⁰ leichte Streckkrämpfe, dabei wiederholt auf die Seite fallend, 11⁵¹ hält sich aber noch nicht auf schiefer Glasebene, 11⁵⁵ nach Bewegung leichte Streckkrämpfe der Glieder, 12⁰⁰ hält sich auf schiefer Glasebene, zeigt große Neigung zum Schlafen, 12⁰⁸ läuft auf dem Tisch herum.

Versuch IX: Mit 0,055 ccm III. Terpentinöl-Destillat unter einer Glasglocke von 9,5 l.

12⁰⁴ Beginn, 12⁰⁶ Destillat verdampft, 2⁰⁶ Maus sitzt ruhig da in normaler Haltung, Augen geschlossen, 2¹⁴ Herausnahme der Maus, läuft umher, geht nicht über die Tischkante, hält sich auf schiefer Glasebene, 2¹⁸ macht einen vollständig normalen Eindruck.

Versuch X: Mit 0,055 ccm III. Terpentinöl-Destillat unter einer Glasglocke von 9,5 l.

2²⁵ Beginn, 2²⁸ Destillat verdampft, 5⁴⁵ Maus liegt halb auf der Seite und schläft, reagiert nicht auf Klopfen gegen die Glaswandung, 7³⁰ Maus läuft stark taumelnd umher, nachdem man sie durch Berühren aus dem Schlaf geweckt hat, 11³⁵ (am anderen Morgen) Maus tot.

Die Sektion ergibt nichts.

Zusammenfassung: Auch geringe Giftdosen der

höheren Terpentindestillate (5 mgr pro l), die in den ersten Stunden ihrer Einwirkung kaum eine leichte Benommenheit hervorrufen, wirken tödlich, sobald sie eine Anzahl Stunden auf das Tier einwirken.

Zu den Versuchen VI bis X ist zusammenfassend zu sagen, daß die höher destillierenden Produkte des Terpentinöls im großen und ganzen dieselben Vergiftungsbilder wie das Pinen geben.

Ich gehe nun über zu den Versuchen mit anderen Terpentinöl-Destillaten.

Versuch XI: Mit 0,12 ccm Terpentinöl aus anderer Quelle, dem Rest der Destillation von 250 ccm Terpentinöl = 50 ccm (braun gefärbt) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10³⁰ Beginn, 10³⁴ Destillat verdampft, 10⁴² Maus läuft sehr aufgeregt herum und fällt um; 10⁵⁰ taumelt in der Bewegung, 10⁵⁵ liegt auf der Seite, 11⁰⁰ Maus kippt an die Glaswandung, linkes Hinterbein dabei gestreckt, auf Schlagen gegen die Glasglocke reagiert sie nur mit einem schwachen Zucken, 11⁰¹ Herausnahme der Maus, läuft herum, fällt mehrfach vom Tisch, 11⁰³ schiebt sich mit der rechten Körperhälfte vorwärts, weil die linke gelähmt ist, zittert, 11¹¹ Maus zeigt wieder normales Benehmen.

Versuch XII: Mit 0,12 ccm II. Terpentinöl-Destillat (Terpentin aus anderer Quelle bezogen) (156—157° C) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

2³⁰ Beginn, 2³⁴ Destillat verdampft, 2⁴⁰ Maus läuft sehr aufgeregt herum, 2⁵⁰ knickt mit dem linken Hinterbein ein, rechtes Hinterbein gelähmt, 2⁵¹ läuft sehr schnell Kreise und fällt dabei auf die Seite, Füße und Schwanz sind gerötet, 2⁵⁶ Krampf im rechten Vorderbein, Maus schwankt beim Männchenmachen, 2⁵⁹ fällt beim Männchen machen um, 3⁰² Maus sehr aufgeregt, taumelt, überschlägt sich, 3⁰⁴ will sich auf die Seite legen, 3⁰⁶ im rechten Hinterbein Streckkrampf, auf Anschlag gegen die Glaswand reagiert Maus kaum, 3⁰⁷ schläft ruhig, 3⁰⁸ Maus liegt vorübergehend in Krämpfen, läuft aber dann wieder im Gefäß herum, 3¹² kippt auf die Seite, Streckkrampf in der linken Vorderpfote, 3¹³ Herausnahme der Maus, läuft in schräger Haltung, fällt mehrfach vom Tisch, 3¹⁵ meidet die Tischkante, 3¹⁸ Maus macht wieder einen leidlich normalen Eindruck.

Zusammenfassung: Beide Destillate wirken ziemlich gleich; nach 20 Minuten taumelt die Maus. Bei Herausnahme nach 30—40 Minuten wird das Verhalten schnell normal.

Weiterhin habe ich die Versuche mit dem sog. deutschen Terpentinöl angestellt; dasselbe ist in allen Verhältnissen mit Alkohol leicht mischbar, während die anderen Präparate nur teilweise darin löslich sind, hat also andere Zusammensetzung.

Versuch XIII: Mit 0,11 ccm des ersten Destillates (158° bis 167° C) deutschen Terpentinöls (spez. Gew. 0,856 bei 19° C) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

11⁰² Beginn, beim Verdampfen bleibt auf dem Filtrierpapier ein heller Fleck (Fett?), 11¹⁵ Maus läuft unruhig hin und her, 11¹⁸ sitzt, Atmung beschleunigt, Augen halb geschlossen, 11²⁸ rast sehr wild umher, 11³⁰ sitzt wieder mit halb geschlossenen Augen, 11³¹ läuft und schwankt, 11³⁶ kippt im Sitzen langsam nach der Seite, 11³⁹ rast wie wild, torkelt dabei stärker, 11⁴³ kippt mit dem Hinterteil ihres Körpers auf die Seite, 11⁴⁶ rasend, fällt wiederholt auf die Seite, 11⁵⁶ torkelt langsam vorwärts, 11⁵⁸ Maus bekommt plötzlich im Sitzen einen Krampf des ganzen Körpers, fällt auf den Rücken und wälzt sich einige Male, 12⁰⁰ liegt mit sehr lebhafter Atmung an die Glaswand gelehnt, Kopf und Bauch liegen auf dem Boden, rechtes Hinterbein zeigt einen Krampf, linkes Hinterbein ist seitwärts gestellt, 12⁰³ fällt ganz auf die Seite, um dann gleich wieder herumzurasen, 12¹² kippt beim Aufrichten an der Glaswand auf den Rücken, Streckkrampf aller Extremitäten, 12¹⁷ dreht sich einige Male im Kreise, 12²⁰ schlägt wiederholt auf die Seite, wird immer rasender in ihren Drehbewegungen, 12²¹ sitzt wieder ruhig, seitwärts gelehnt, zeigt Zitterkrämpfe der Gesichtsmuskulatur und einen Streckkrampf im linken Hinterbein, 12³⁰ Krampf der Hinterbeine, 12³² Herausnahme der Maus; sie schwankt erheblich, erholt sich in einer Viertelstunde.

Versuch XIV: Mit 0,11 ccm des II. Destillats (167°—177° C) deutschen Terpentinöls (spez. Gew. 0,859 bei 19° C) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

3¹² Beginn, 3³⁰ fällt unsicher beim Springen auf die Beine, 3³³ kippt nach der Seite beim Indiehöhespringen, 3³⁸ schwankt im Laufen, 3⁵¹ Maus fällt auf die Seite, 3⁵³ fällt wiederholt auf die Seite und ist ununterbrochen in wilder Bewegung, 3⁵⁵ kugelt auf den Rücken, 4⁰⁰ fällt wiederholt auf den Rücken und rast

umher, 4¹⁰ schlägt auf die Seite, wird ruhiger, 4¹⁵ schleppt sich stark torkelnd mühsam vorwärts, 4¹⁶ rast herum, fällt von der Seite auf den Rücken, 4²⁸ Maus wälzt sich in Krämpfen, 4²⁹ fällt auf den Rücken, in dieser Stellung Streckkrampf des Rumpfes und der Extremitäten, 4³⁰ wälzt sich lange Zeit in Krämpfen, 4³¹ dreht sich im Kreise, wobei die Hinterhand der Maus gelähmt erscheint, fällt mit Streckkrampf wieder auf den Rücken; 4³² Herausnahme der Maus, dreht sich um sich selbst, kippt im Krampf auf den Rücken, fällt über die Tischkante, hält sich nicht auf schiefer Glasebene, 4³³ wälzt sich in schweren Krämpfen, 4³⁶ in den Schwanz gekniffen, stößt sie einen lauten, piependen Ton aus, 4³⁷ dreht sich im Kreise, rechtes Vorder- und Hinterbein sind gelähmt, 4³⁹ Maus zeigt nach Erwärmung über dem Ofen lang andauernde, schwerste Krämpfe, 4⁴⁶ sitzt ruhig mit abduziertem rechtem Hinterbein, 4⁴⁷ läuft wild umher, dabei wiederholt vom Tisch auf den Boden fallend, 4⁵⁰ wälzt sich in Krämpfen. Am anderen Morgen: 10³⁰ Maus liegt apathisch im Glasgefäß, zum Laufen ist sie nicht zu bewegen, Atmung schlecht, 10⁵⁵ auf Wärmereiz zeigt sie zuckende Bewegungen über den ganzen Körper, aus den Konjunktivalsäcken der Augen läßt sich eine milchige Flüssigkeit herausdrücken, Linse und vordere Augenkammer erscheinen getrübt, 11⁰⁰ die Atmung der Maus ist sehr oberflächlich, nach künstlicher Atmung erfolgt ein Streckkrampf des Rumpfes und der Extremitäten, 11¹⁹ Maus tot.

Die Sektion ergibt ein Infiltrat der rechten Lunge. Bemerkenswert ist in diesem Fall die Nachwirkung.

Versuch XV: Mit 0.055 ccm des II. Destillats (167°—177° C) deutschen Terpentins (spez. Gew. 0.859 bei 19° C) unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10⁴⁰ Beginn, Verdampfung des Destillates nicht nachzuweisen, 12³⁵ Maus läuft, springt, klettert, 12⁴⁰ fällt unsicher beim Springen, 12⁵³ sitzt ruhig, nach Berühren mit der Verdunstungsfahne läuft sie mit Kopf und Bauch auf dem Boden, um aber bald wieder ruhig sitzen zu bleiben, 1⁰⁰ Herausnahme der Maus, zeigt ein völlig normales Verhalten.

Versuch XVI: Mit 0.11 ccm des II. Destillats deutschen Terpentins unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10³⁶ Beginn, 11¹¹ schwankt beim Männchenmachen nach

hinten über, 11²⁰ fällt, indem sie an der Glaswandung in die Höhe springt, wiederholt unsicher auf die Beine, 11²⁶ kippt fortwährend nach der Seite beim Springen, 11⁴⁰ Maus rasend in ihren Bewegungen, 11⁴³ sitzt mit sehr beschleunigter Atmung ruhig, 11⁴⁵ rennt wieder herum, stark taumelnd, Augen halb geschlossen, 11⁴⁶ taumelt im Sitzen nach der Seite, 11⁵⁶ Herausnahme der Maus, Bewegung der Maus in der ersten Minute etwas unsicher, nachher normales Benehmen.

Aus den Versuchsprotokollen ergibt sich, daß sich das deutsche Terpentinöl nicht wesentlich anders verhält, wie das sonst im Handel befindliche.

Es sei nun kurz darauf hingewiesen, daß durch andere Versuche im Pharmakologischen Institut zu Gießen nachgewiesen war, daß Terpentinölersatz, wie namentlich das Sangajol, weniger giftiger ist, wie das Terpentinöl, wie das bereits von Lehmann (loko citato) betont wurde. Man kann mit Sangajol bei der Dosis von 10 mgr auf das Liter und einer Versuchsdauer von 3 Stunden nur sehr geringe Veränderungen nachweisen, falls überhaupt solche stattfinden.

Unter diesen Umständen erschien es von Interesse, noch einen anderen Terpentinölersatz, der als „Terpentinöl-Ersatz“ sich im Handel befindet und ein ziemlich einheitlicher Körper zu sein scheint, zu prüfen (spez. Gew. 0,889 und destilliert über bei 190—192° C).

Versuch XVII: Mit 0,11 ccm Terpentinöl-Ersatz unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10⁵⁸ Beginn, 12⁴⁵ torkelt deutlich im Laufen, 12⁵² im Sitzen zeigt die Maus im linken Hinterbein einen leichten Zitterkrampf, 12⁵⁵ läuft unruhig hin und her, 2⁰⁰ sitzt ruhig an die Glaswandung gelehnt, auf Klopfen an die Glocke läuft und torkelt sie, 3⁰⁰ Herausnahme der Maus, fällt in der ersten Minute einmal über die Tischkante, erholt sich dann schnell, frißt noch am selben Abend ihr Futter.

Versuch XVIII: Mit 0,11 ccm Terpentinöl-Ersatz unter einer Glasglocke von 9,5 l.

10⁰⁰ Beginn, Verdampfung nicht nachzuweisen, 11⁰⁰ Maus läuft andauernd hin und her, 1⁵⁵ sitzt ruhig, treibt man sie vorwärts, torkelt sie ein wenig, 2⁰⁰ Herausnahme der Maus, läuft

sofort auf dem Tisch herum, ohne auf den Boden zu fallen, zeigt auch sonst ein völlig normales Verhalten.

Zusammenfassung: Dieses Präparat unterscheidet sich deutlich von den Terpentinen und seinen Destillaten; es wirkt offenbar weniger giftig.¹⁾

Im ganzen ergibt sich aus den Versuchen, daß ein Gehalt der Atmosphäre an Terpentindampf, welcher 10 mgr im Liter entspricht, spätestens binnen einer Stunde bei Mäusen deutliche Vergiftungserscheinungen hervorbringt. Das entspricht für Pinen einer Atmosphäre von 0,18 Volumen % Dampf bei 20° C. Mit 5 mgr pro Liter erhält man in 3 Stunden nur sehr schwache Wirkungen, bei längerer Einwirkung allerdings auch hier starke Vergiftungen. Die verschiedenen Bestandteile des Terpentinöls unterscheiden sich in der Wirkung nicht wesentlich.

Das deutsche Terpentinöl unterscheidet sich nicht wesentlich von den übrigen Präparaten.

Der untersuchte Terpentinersatz war weniger giftig wie das officinelle Terpentinöl.

Zum Schluß gestatte ich mir, Herrn Geh. Rat Professor Dr. Geppert und Herrn Apotheker Lüttringhaus, Assistent des Pharmakologischen Instituts zu Gießen, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

¹⁾ Es war vor längerer Zeit aus diesem Terpentinersatz ein Destillat hergestellt, das schwach verkorkt im Glaskolben gestanden hatte; auffallenderweise ergab es abweichende Resultate: Zwei Mäuse bekamen nach starker Excitation in $\frac{3}{4}$ —1 Stunde ein plötzlichen Krampfanfall, an dem sie zugrunde gingen.

Lebenslauf.

Ich, Joachim Schmidt, bin geboren am 4. Dezember 1899 in Bomlitz, Kreis Fallingb., als Sohn des Fabrikdirektors Dr. phil. Rudolph Schmidt zu Bomlitz und seiner Gemahlin Luisa, geb. Brunswig. Besuchte anfänglich die Volksschule meines Heimatortes, anschließend einige Jahre die Mittelschule zu Walsrode, Provinz Hannover, um 1917 mich mit Primareife nach 1 $\frac{1}{4}$ jähriger Schulzeit auf der Humboldtschule zu Hannover-Linden als Kriegsfreiwilliger dem Heere zu stellen. War Soldat bis April 1919, davon 4 Monate im Felde an der Westfront, und kehrte nach meiner Militärzeit in die Humboldtschule zurück. Nach der Reifeprüfung am 1. März 1920 bezog ich die Universitäten zu Göttingen und Gießen, bestand am 31. Juli 1925 mein medizinisches Staatsexamen, um ab 1. August 1925 als Medizinal-Praktikant in Gießen und der Lungenheilstation Waldhof-Elgershausen, Kreis Wetzlar, tätig zu sein.

J o a c h i m S c h m i d t.

